

INSTRUCCIONES POPULARES

PARA IMPEDIR
LA PROPAGACIÓN DEL

ZANCUDO



PUNTARENAS. COSTA RICA

TIP. EL PACIFICO

10570

INSTRUCCIONES POPULARES

PARA IMPEDIR LA PROPAGACION DEL ZANCUDO

Dada la importancia que reviste en este momento la campaña sanitaria contra el ZANCUDO para evitar la propagación de las enfermedades, cuyo agente transmisor es él, como son; EL PALUDISMO, FIEBRE AMARILLA Y FILARIA, se publican estas breves instrucciones populares con el objeto de vulgarizar ciertos conocimientos en el pueblo y lograr de esta manera una útil é inteligente cooperación de su parte al fin que persigue la Jefatura de Sanidad.

COMO SE CRIA EL ZANCUDO

El ZANCUDO pone sus huevos en los depósitos de agua, en la madrugada, y el número de éstos varía entre 80 y 180 por cada uno, según especies.

El ZANCUDO prefiere, para poner sus huevos, las aguas limpias que estén en depósitos en el interior de las casas. Por lo tanto, los tanques, barriles, tinajas, y otros sitios en que haya AGUAS ESTANCOADAS y no estén propiamente tapados, son por lo general, lugares ciertos de crías de ZANCUDOS.

También son criaderos de ZANCUDOS: canales que no corran bien, latas y botellas vacías que se llenan de agua, cáscaras de cocos, depósitos llenos de agua que se ponen en las patas de las mesas y fiambreras para impedir el acceso á las hormigas, y en general CUALQUIER DEPÓSITO Ó VASIJA QUE CONTENGA AGUA.

CAMBIOS QUE SE VERIFICAN EN LA VIDA DEL ZANCUDO

Al salir el embrión del huevo se trasforma en larva (gusarapo ó cabezón).

Desde el punto de vista sanitario es éste el período más importante por ser en el que se hace prácticamente posible la destrucción del ZANCUDO. Puede considerarse que en condiciones normales tarda de 10 á 24 horas.

La LARVA permanece por término medio en esa forma durante siete días, en que se trasforma en PUPA, cuya existencia es muy corta, á lo más dos días, para transformarse ya en ZANCUDO; bajo estas formas evolutivas necesita el ZANCUDO de aire para respirar, para lo cual tiene que subir á la superficie del agua. Se puede calcular la evolución completa desde huevo hasta ZANCUDO en 10 ú 11 días.

fatura de Sanidad, á la que se debe por los humanitarios fines que persigue, leal y sincera cooperación.

De todo depósito de agua que encuentren los visitadores de higiene y que contengan larvas de zancudos, darán parte inmediatamente al Jefe de Sanidad, quien impondrá la multa correspondiente al cabeza de familia ó encargado de la casa.